



PHAGO'GEL

Special pentru Piele Sensibilă

Gel hidro-alcoolic pentru dezinfectia mâinilor



Puncte forte

- ✓ Bine tolerat
- ✓ Hipoalergenic (*formulat pentru a minimiza riscul de reacții alergice*)
- ✓ Poate fi utilizat rapid
- ✓ Bactericid, fungicid, micobactericid și virucid
- ✓ Fără parfum, colorant, fenoxietanol sau parabeni

Ambalaj

Prezentare	Număr de unități/cutie
Flacon de 100 ml	30 flacoane
Flacon de 300 ml	20 flacoane
Flacon de 500 ml	20 flacoane
Flacon de 1L airless	12 flacoane
Bidon de 5 litri	2 bidoane



PHAGO'GEL

Special pentru Piele Sensibilă

Aplicații

PHAGO'GEL este biocid.

PHAGO'GEL este destinat dezinfecției chirurgicale a mâinilor prin frecare: alternativă la simpla spălare a mâinilor în scopuri igienice, în the absența unui punct de alimentare cu apă sau pentru utilizare frecventă, înainte de a efectua o activitate care necesită aseptie, etc.

Componente

- ✓ Etanol (Nr. CAS 64-17-5): 72% m/m
- ✓ Agent de denaturare
- ✓ Glicerină hidratantă și emolientă
- ✓ Alcool Myristic (pentru proprietăți emoliente)
- ✓ Agent de gelifiere
- ✓ Fără fenoxietanol, colorant, parfum sau parabeni

Caracteristici organoleptice și fizico-chimice

- ✓ Aspect: gel
- ✓ Culoare: incolor
- ✓ Miros: alcool
- ✓ pH (produs pur) la 20°C: 8.0 ± 0.5
- ✓ Densitate la 20°C (g/ml): 0.868 ± 0.005

Mod de utilizare

Numai pentru uz profesional.

PHAGO'GEL gata de utilizare se aplică numai pe piele sănătoasă, curată și uscată.

Dezinfecție igienică:

- ✓ Unghiile trebuie să fie scurte și nevopsite; mâneci scurte sau suflecate.
- ✓ Turnați 3 ml de **PHAGO'GEL** în palmă.
- ✓ Frecați mâinile și încheieturile cel puțin 30 secunde, conform procedurii standard.
- ✓ Aplicarea gelului trebuie să asigure acoperirea mâinilor cu un strat de gel.

Dezinfecție chirurgicală:

- ✓ Unghiile trebuie să fie scurte și nevopsite; mâneci scurte sau suflecate.
- ✓ Turnați 3 ml de **PHAGO'GEL** în palmă.
- ✓ Frecați mâinile, încheieturile, antebrățele și coatele până vor fi complet uscate (≥ 45 sec.);
- ✓ Turnați 3 ml de **PHAGO'GEL** în palmă.
- ✓ Frecați până la mâneci, conform metodelor pentru dezinfecția igienică, până la uscarea completă (≥ 45 sec.).

Atenție la utilizarea biocidelor.

Înainte de a utiliza produsul, citiți eticheta și celelalte informații furnizate.

Precauții la utilizare

- ✓ Atenție la utilizarea biocidelor. Înainte de a utiliza produsul, citiți eticheta și celelalte informații furnizate.
- ✓ Consultați instrucțiunile din Fișa tehnică de securitate, disponibilă la: www.quickfds.com

Activitate antimicrobină

STANDARD	CONCENTRAȚIE	TIMP
BACTERICID		
EN 1040 [2006]	80%	15 sec.
EN 13727 + A1 [2013]	80%	30 sec.
EN 1500 [2013]	3 ml	30 sec.
EN 12791 [2016] 3 ore persistență	2 x 3 ml	2 x 45 sec.
MICOBACTERICID		
EN 14348 [2005]	80%	30 sec.
FUNGICID		
EN 1275 [2006] (<i>C. albicans</i>)	80%	15 sec.
EN 1650 [2008] (<i>C. albicans</i>)	80%	15 sec.
EN 13624 [2013]	97%	30 sec.
VIRUCID		
EN 14476 [2013] (<i>Poliovirus</i>)	97%	30 sec.
EN 14476 [2013] (<i>Adenovirus</i>)	80%	30 sec.
EN 14476 [2013] (<i>Norovirus</i>)	97%	30 sec.
EN 14476 [2007] (<i>Rotavirus</i>)	80%	15 sec.
DVV-RKI (BVDV)	80%	15 sec.
DVV-RKI (<i>Vaccinia virus</i>)	80%	15 sec.
DVV-RKI (HBV, HCV, HIV, Herpes virus, Coronavirus (inclusiv VRS), Orthomyxovirus, Influenza A/H1N1 și Influenza A/H5N1)	80%	15 sec.

Studiu privind aerobiocontaminarea disponibil la cerere.

Consultați dosarul științific pentru mai multe informații și rapoarte detaliate.