

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID
NR. RO/2019/0032/MRA / IE/BPA 70530**

In conformitate cu prevederilor REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide si ale HOTARÂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide, in baza documentelor depuse in dosarul tehnic, Comisia Nationala pentru Produse Biocide, in sedinta din data 18.11.2019, a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piata in Romania, conform prevederilor legale in vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

reînnoirea autorizației naționale eliberată în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012

- Nr. Autorizatiei nationale care a fost reînnoită : **IE/BPA 70004** cu autorizatia nationala nr. **IE/BPA 70530**

II. Data emiterii autorizatiei : 26.11.2019**III. Data expirării autorizatiei : 30.04.2023****IV.****DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: RUBIS PASTA****V.****NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI din România: LODI S.A.S.**

ADRESA: Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390, Grand Fougeray, France

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: LODI S.A.S.

ADRESA : Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390, Grand Fougeray, France

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID : LODI S.A.S.

ADRESA : Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390, Grand Fougeray, France

ADRESA LOCULUI DE FABRICARE : Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390, Grand Fougeray, France

NUMELE FABRICANTULUI fiecărei SUBSTANTE ACTIVE : PelGar International Limited

ADRESA : Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, UK

ADRESA UNITĂȚILOR DE FABRICARE : Prazska, 280 02 Kolin, Czech Republic

VI.**TIPUL DE PRODUS: TP14(Rodenticide)****VII.****CATEGORIILE DE UTILIZATORI: profesioniști și profesioniști instruiți.****VIII.****TIPUL PREPARATULUI : Momeala rodenticida sub forma de pasta****IX COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ****1) Substanta activă****a) substante chimice**

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**


Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Denumirea IUPAC	Difenacoum
Numar CAS	56073-07-5
Numar CE	259-978-4
Continut de substantă activă	0,005%
2) Substanta nonactivă	
Denumirea IUPAC	Butyl hydroxytoluene
Numar CAS	128-37-0
Numar CE	204-881-4
Continut de substantă activă	<0,2%

X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUIA. Produs biocid cu substanțe active - *substanțe chimice*

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	 Pericol
Fraze de risc H	H360D- Poate dăuna fătului. H373 -Risc posibil de efecte grave pentru organe (sânge) ca urmare a expunerilor repetate sau a unei expuneri prelungite.
Fraze de prudență P	P201- Obțineți instrucțiunile înainte de utilizare. P202 -Nu manipulați produsul înainte să fi citit și înțeles toate precauțiile în materie de securitate. P260- Nu respirați praful. P280- Purați manși de protective P314- Consultați medical, dacă nu va simțiți bine P308-P313- IN CAZ DE expunere sau de posibila expunere: consultați medical. P405 Păstrați produsul sub cheie. P501 Eliminați conținutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deșeurilor

XI. AMBALAREA

Șoareci de casă (*Mus musculus*, tineret și adulți) – profesional – la interior
Dimensiune minimă a pachetului: 3 kg.
Grame/kg de momeală per sac: 10g sau în cartuș de 50 g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g , 270g, 280g, 310g, 500g
Material de ambalare:
- 10g
Recipient tip galeata (PP, PE): 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)
Cutie de carton cu căptușeală interioară PE: 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)
Statie de intoxicare sub forma de momeala preformulata (PVC, PS, PP) 2x10g, 3x10g în cutie de carton: 3Kg, 3.5Kg, 4Kg, 4.5Kg, 5Kg
Cartuș PP în cutie de carton: 3Kg la 5Kg
Șobolani (*Rattus norvegicus*-șobolanul brun - tineret și adulți si *Rattus rattus* - șobolanul negru - tineret și adulți) – profesional – la interior
Dimensiune minimă a pachetului: 3 kg.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Grame/kg de momeală per sac: 10g sau în cartuș de 50 g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g , 270g, 280g, 310g, 500g

Material de ambalare:

- 10g

Recipient tip galeata (PP, PE): 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

Cutie de carton cu căptușeală interioară PE: 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

Statie de intoxicare sub forma de momeala preformulata (PVC, PS, PP) 2x10g, 3x10g în cutie de carton: 3Kg, 3.5Kg, 4Kg, 4.5Kg, 5Kg

- Cartuș PP în cutie de carton: 3Kg la 5Kg

Șoareci de casă și/sau șobolani (*Mus musculus*-șoarecele de casă- tineret și adulți, *Rattus norvegicus* - șobolanul brun - tineret și adulți si *Rattus rattus* - șobolanul negru - tineret și adulți) – profesional – la exterior, în jurul clădirilor

Dimensiune minimă a pachetului: 3 kg.

Grame/kg de momeală per sac: 10g sau în cartuș de 50 g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g , 270g, 280g, 310g, 500g

Material de ambalare:

- 10g

Recipient tip galeata (PP, PE): 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

Cutie de carton cu căptușeală interioară PE: 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

Statie de intoxicare sub forma de momeala preformulata (PVC, PS, PP) 2x10g, 3x10g în cutie de carton: 3Kg, 3.5Kg, 4Kg, 4.5Kg, 5Kg

Cartuș PP în cutie de carton: 3Kg la 5Kg

Șoareci de casă și/sau șobolani (*Mus musculus*-șoarecele de casă - tineret și adulți *Rattus norvegicus*-șobolanul brun - tineret și adulți si *Rattus rattus* - șobolanul negru - tineret și adulți) – experți (utilizare profesionala cu instruire) – la interior

Dimensiune minimă a pachetului: 3 kg.

Grame/kg de momeală per sac: 10g sau în cartuș de 50 g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g , 270g, 280g, 310g, 500g

Material de ambalare:

- 10g

Recipient tip galeata (PP, PE): 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

Cutie de carton cu căptușeală interioară PE: 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

Statie de intoxicare sub forma de momeala preformulata (PVC, PS, PP) 2x10g, 3x10g în cutie de carton: 3Kg, 3.5Kg, 4Kg, 4.5Kg, 5Kg

Cartuș PP în cutie de carton: 3Kg la 5Kg

Șoareci și/sau șobolani (*Mus musculus* - șoarecele de casă - tineret și adulți, *Rattus norvegicus*-șobolanul brun- tineret și adulți si *Rattus rattus* - șobolanul negru - tineret și adulți)– experți

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



(utilizare profesionala cu instruire) – la exterior și în jurul clădirilor

Dimensiune minimă a pachetului: 3 kg.

Grame/kg de momeală per sac: 10g sau în cartuș de 50 g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g, 270g, 280g, 310g, 500g

Material de ambalare:

- 10g

Recipient tip galeata (PP, PE): 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

Cutie de carton cu căptușeală interioară PE: 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

Statie de intoxicare sub forma de momeala preformulata (PVC, PS, PP) 2x10g, 3x10g în cutie de carton: 3Kg, 3.5Kg, 4Kg, 4.5Kg, 5Kg

Cartuș PP în cutie de carton: 3Kg la 5Kg

Șobolani (*Rattus norvegicus*-șobolanul brun - tineret și adulți și *Rattus rattus* - șobolanul negru - tineret și adulți) – experți (utilizare profesionala cu instruire) – zone exterioare deschise și depozite de deșuri

Dimensiune minimă a pachetului: 3 kg.

Grame/kg de momeală per sac: 10g sau în cartuș de 50 g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g , 270g, 280g, 310g, 500g

Material de ambalare:

- 10g

Recipient tip galeata (PP, PE): 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

Cutie de carton cu căptușeală interioară PE: 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

Statie de intoxicare sub forma de momeala preformulata (PVC, PS, PP) 2x10g, 3x10g în cutie de carton: 3Kg, 3.5Kg, 4Kg, 4.5Kg, 5Kg

Cartuș PP în cutie de carton: 3Kg la 5Kg

XII.**INSTRUCȚIUNILE SI DOZELE DE APLICARE**

Poate fi utilizat în interior și exterior în jurul clădirilor, zone exterioare deschise și depozite de deșuri.

Utilizatori profesioniști: - în interior

Soareci: 20-30 g momeala / statie de intoxicare, la fiecare 3 m (infestare mare), respectiv 5 m (infestare mica).

Instrucțiuni de utilizare:

- Pentru soareci, folosiți 20-30 g momeala în stații de momeala sigure, rezistente la distrugere, amplasate la 5 m distanță (3 m distanță în zonele cu infestare mare) în zonele în care soarecii sunt activi.
- Stațiile de momeala trebuie amplasate în imediată apropiere a locurilor unde a fost observată anterior activitatea rozătoarelor (de exemplu, cai de acces, trasee, locuri de cuibarire, gauri, burlane etc.).
- Verificați regulat consumul de momeala și înlocuiți momeala consumată sau deteriorată până la încetarea consumului.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



- Repetati tratamentul in situatii in care exista dovezi ale unei noi infestari (de exemplu, urme proaspete sau excremente). Soarecii sunt foarte curiosi si poate ajuta programul de combatere sa mutati momeala la fiecare 2-3 zile in momentul in care punctele de momeala sunt inspectate sau reumplute. Faceti inspectii frecvente ale punctelor de momeala in primele 10-14 zile si inlocuiti orice momeala mancata de rozatoare sau care a fost deteriorata de apa sau contaminata de murdarie. Daca toata momeala din anumite zone a fost consumata, cresteti cantitatea de momeala prin plasarea mai multor puncte de momeala. Nu mariti dimensiunea punctului momeala. Inlocuiti orice momeala mancata de rozatoare sau care a fost deteriorata de apa sau contaminata de murdarie.
- Statiile de momeala trebuie vizitate la 2 - 3 zile la inceputul tratamentului si cel putin saptamanal dupa aceea, pentru a verifica daca momeala este acceptata, statiile de momeala sunt intacte si pentru a indeparta corpurile rozatoarelor. Reumpleti momeala atunci cand este necesar.
- Starea de rezistenta a populatiei tinta trebuie luata in considerare atunci cand se alege rodenticidul de utilizat. In acele zone in care sunt suspectate dovezi de rezistenta la anumite ingrediente active, evitati utilizarea acestora. Pentru a controla raspandirea rezistentei, se recomanda alternarea momelilor care contin diferite ingrediente active anticoagulante.
- Nu folositi acest produs pentru tratament permanent sau pulsatoriu.
- Indepartati momeala ramasa sau statiile de momeala la sfarsitul perioadei de tratament.

Utilizatori profesionisti: - in interior

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenusiu si *Rattus rattus* – sobolanul negru de acoperis): 90-100 g momeala / statie de intoxicare, la fiecare 5 m (infestare mare), respectiv 10 m (infestare mica).
Instructiuni de utilizare:

- Pentru sobolani, folositi 90-100 g momeala in statii de momeala sigure, rezistente la distrugere, amplasate la 10 m distanta (5 m distanta in zonele cu infestare mare).
- Statiile de momeala trebuie amplasate in imediata apropiere a locurilor unde a fost observata anterior activitatea rozatoarelor (de exemplu, cai de acces, trasee, locuri de cuibarire, gauri, burlane etc.).
- Verificati regulat consumul de momeala si inlocuiti momeala consumata sau deteriorata pana la incetarea consumului.
- Repetati tratamentul in situatii in care exista dovezi ale unei noi infestari (de exemplu, urme proaspete sau excremente). Nu miscati si nu deranjati punctele de momeala timp de cateva zile dupa ce s-a pus momeala. Daca nu se observa semne de activitate aproape de momeala dupa 7-10 zile, mutati momeala intr-o zona cu activitate mai mare a sobolanilor.
- Statiile de momeala trebuie vizitate la 5 - 7 zile la inceputul tratamentului si cel putin saptamanal dupa aceea, pentru a verifica daca momeala este acceptata, statiile de momeala sunt intacte si pentru a indeparta corpurile rozatoarelor. Reumpleti momeala atunci cand este necesar.
- Starea de rezistenta a populatiei tinta trebuie luata in considerare atunci cand se alege rodenticidul de utilizat. In acele zone in care sunt suspectate dovezi de rezistenta la anumite ingrediente active, evitati utilizarea acestora. Pentru a controla raspandirea rezistentei, se recomanda alternarea momelilor care contin diferite ingrediente active anticoagulante.
- Nu folositi acest produs pentru tratament permanent sau pulsatoriu.
- Indepartati momeala ramasa sau statiile de momeala la sfarsitul perioadei de tratament.

Utilizatori profesionisti: - exterior in jurul cladirilor

Soareci: 20-30 g momeala / statie de intoxicare, la fiecare 3 m (infestare mare), respectiv 5 m (infestare mica).

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenusiu si *Rattus rattus* – sobolanul negru de acoperis): 90-100 g momeala / statie de intoxicare, la fiecare 5 m (infestare mare), respectiv 10 m (infestare mica).
Instructiuni de utilizare:

- Pentru soareci, folositi 20-30 g momeala in statii de momeala sigure, rezistente la distrugere, amplasate la 5 m distanta (3 m distanta in zonele cu infestare mare) in zonele in care soarecii sunt



activi. Repetati tratamentul in situatii in care exista dovezi ale unei noi infestari (de exemplu, urme proaspete sau excremente). Soarecii sunt foarte curiosi si poate ajuta programul de combatere sa mutati momeala la fiecare 2-3 zile in momentul in care punctele de momeala sunt inspectate sau reumplute. Faceti inspectii frecvente ale punctelor de momeala in primele 10-14 zile si inlocuiti orice momeala mancata de rozatoare sau care a fost deteriorata de apa sau contaminata de murdarie. Daca toata momeala din anumite zone a fost consumata, cresteti cantitatea de momeala prin plasarea mai multor puncte de momeala. Nu mariti dimensiunea punctului momeala.

- Pentru sobolani, folositi 90-100 g momeala in statii de momeala sigure, rezistente la distrugere, amplasate la 10 m distanta (5 m distanta in zonele cu infestare mare). Repetati tratamentul in situatii in care exista dovezi ale unei noi infestari (de exemplu, urme proaspete sau excremente). Nu miscati si nu deranjati punctele de momeala timp de cateva zile dupa ce s-a pus momeala. Daca nu se observa semne de activitate aproape de momeala dupa 7-10 zile, mutati momeala intr-o zona cu activitate mai mare a sobolanilor. Daca toata momeala din anumite zone a fost consumata, cresteti cantitatea de momeala prin plasarea mai multor puncte de momeala. Nu mariti dimensiunea punctului momeala.

- Statiile de momeala trebuie amplasate in imediata apropiere a locurilor unde a fost observata anterior activitatea rozatoarelor (de exemplu, cai de acces, trasee, locuri de cuibarire, gauri, burlane etc.).

- Inlocuiti momelile deteriorate de apa sau contaminate cu pamant, din interiorul capcanelor.

- Protejati momeala impotriva conditiilor atmosferice (ploaie, zapada, etc.). Amplasati capcanele in zone fara risc de inundare.

- Starea de rezistenta a populatiei tinta trebuie luata in considerare atunci cand se alege rodenticidul de utilizat. In acele zone in care sunt suspectate dovezi de rezistenta la anumite ingrediente active, evitati utilizarea acestora. Pentru a controla raspandirea rezistentei, se recomanda alternarea momelilor care contin diferite ingrediente active anticoagulante.

- Nu folositi acest produs pentru tratament permanent sau pulsatoriu.

- Indepartati momeala ramasa sau statiile de momeala la sfarsitul perioadei de tratament.

Utilizatori profesionisti instruiti: - in interior

Soareci: 20-30 g momeala / statie de intoxicare, la fiecare 3 m (infestare mare), respectiv 5 m (infestare mica).

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenuziu si *Rattus rattus* – sobolanul negru de acoperis): 90-100 g momeala / statie de intoxicare, la fiecare 5 m (infestare mare), respectiv 10 m (infestare mica).

Instructiuni de utilizare:

- Pentru soareci, folositi 20-30 g momeala in statii de momeala sigure, rezistente la distrugere, amplasate la 5 m distanta (3 m distanta in zonele cu infestare mare) in zonele in care soarecii sunt activi. Repetati tratamentul in situatii in care exista dovezi ale unei noi infestari (de exemplu, urme proaspete sau excremente). Soarecii sunt foarte curiosi si poate ajuta programul de combatere sa mutati momeala la fiecare 2-3 zile in momentul in care punctele de momeala sunt inspectate sau reumplute. Faceti inspectii frecvente ale punctelor de momeala in primele 10-14 zile si inlocuiti orice momeala mancata de rozatoare sau care a fost deteriorata de apa sau contaminata de murdarie. Daca toata momeala din anumite zone a fost consumata, cresteti cantitatea de momeala prin plasarea mai multor puncte de momeala. Nu mariti dimensiunea punctului momeala.

- Pentru sobolani, folositi 90-100 g momeala in statii de momeala sigure, rezistente la distrugere, amplasate la 10 m distanta (5 m distanta in zonele cu infestare mare). Repetati tratamentul in situatii in care exista dovezi ale unei noi infestari (de exemplu, urme proaspete sau excremente). Nu miscati si nu deranjati punctele de momeala timp de cateva zile dupa ce s-a pus momeala. Daca nu se observa semne de activitate aproape de momeala dupa 7-10 zile, mutati momeala intr-o zona cu activitate mai mare a sobolanilor. Daca toata momeala din anumite zone a fost consumata, cresteti cantitatea de momeala prin plasarea mai multor puncte de momeala. Nu mariti dimensiunea punctului

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: +(40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: +(40 21) 311 86 20; Fax: +(40 21) 311 86 22



momeala.

- Statiile de momeala trebuie amplasate in imediata apropiere a locurilor unde a fost observata anterior activitatea rozatoarelor (de exemplu, cai de acces, trasee, locuri de cuibarire, gauri, burlane etc.).
- Verificati regulat consumul de momeala si inlocuiti momeala consumata sau deteriorata pana la incetarea consumului. Repetati tratamentul in situatii in care exista dovezi ale unei noi infestari (de exemplu, urme proaspete sau excremente). Faceti inspectii frecvente ale punctelor de momeala in primele 10-14 zile.
- Frecventa vizitelor zonei tratate trebuie sa fie la discretia operatorului, avand in vedere inspectia efectuata la inceputul tratamentului. Acea frecventa trebuie sa fie conforma cu recomandarile prevazute de codul de bune practici relevant.
- Starea de rezistenta a populatiei tinta trebuie luata in considerare atunci cand se alege rodenticidul de utilizat. In acele zone in care sunt suspectate dovezi de rezistenta la anumite ingrediente active, evitati utilizarea acestora. Pentru a controla raspandirea rezistentei, se recomanda alternarea momelilor care contin diferite ingrediente active anticoagulante.
- Indepartati momeala ramasa sau statiile de momeala la sfarsitul perioadei de tratament.
- Pentru tratament permanent: In cazul in care este posibil, se recomanda ca zona tratata sa fie verificata la fiecare 4 saptamani, cel mult, pentru a evita selectia oricarei populatii rezistente. [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant. Utilizatori profesioniști instruiti: - in exterior in jurul cladirilor
Soareci: 20-30 g momeala / statie de intoxicare, la fiecare 3 m (infestare mare), respectiv 5 m (infestare mica).

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenușiu și *Rattus rattus* – sobolanul negru de acoperis): 90-100 g momeala / statie de intoxicare, la fiecare 5 m (infestare mare), respectiv 10 m (infestare mica).
In vizuini: 90-100 g momeala/vizuina.

Instructiuni de utilizare:

- Pentru soareci, folositi 20-30 g momeala in statii de momeala sigure, rezistente la distrugere, amplasate la 5 m distanta (3 m distanta in zonele cu infestare mare) in zonele in care soarecii sunt activi. Repetati tratamentul in situatii in care exista dovezi ale unei noi infestari (de exemplu, urme proaspete sau excremente). Soarecii sunt foarte curiosi si poate ajuta programul de combatere sa mutati momeala la fiecare 2-3 zile in momentul in care punctele de momeala sunt inspectate sau reumplute. Faceti inspectii frecvente ale punctelor de momeala in primele 10-14 zile si inlocuiti orice momeala mancata de rozatoare sau care a fost deteriorata de apa sau contaminata de murdarie. Daca toata momeala din anumite zone a fost consumata, cresteti cantitatea de momeala prin plasarea mai multor puncte de momeala. Nu mariti dimensiunea punctului momeala.
- Pentru sobolani, folositi 90-100 g momeala in statii de momeala sigure, rezistente la distrugere, amplasate la 10 m distanta (5 m distanta in zonele cu infestare mare). Repetati tratamentul in situatii in care exista dovezi ale unei noi infestari (de exemplu, urme proaspete sau excremente). Nu miscati si nu deranjati punctele de momeala timp de cateva zile dupa ce s-a pus momeala. Daca nu se observa semne de activitate aproape de momeala dupa 7-10 zile, mutati momeala intr-o zona cu activitate mai mare a sobolanilor. Daca toata momeala din anumite zone a fost consumata, cresteti cantitatea de momeala prin plasarea mai multor puncte de momeala. Nu mariti dimensiunea punctului momeala.
- Statiile de momeala trebuie amplasate in imediata apropiere a locurilor unde a fost observata anterior activitatea rozatoarelor (de exemplu, cai de acces, trasee, locuri de cuibarire, gauri, burlane etc.).
- Pentru utilizare în exterior, statiile de intoxicare trebuie acoperite si plasate in locuri strategice pentru a reduce expunerea la speciile care nu sunt vizate.
- Verificati regulat consumul de momeala si inlocuiti momeala consumata sau deteriorata pana la

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



incetarea consumului. Repetati tratamentul in situatii in care exista dovezi ale unei noi infestari (de exemplu, urme proaspete sau excremente). Faceti inspectii frecvente ale punctelor de momeala in primele 10-14 zile.

- Statiile de momeala trebuie vizitate la 5 - 7 zile la inceputul tratamentului si cel putin saptamanal dupa aceea, pentru a verifica daca momeala este acceptata, statiile de momeala sunt intacte si pentru a indeparta corpurile rozatoarelor. Reumpleti momeala atunci cand este necesar.
- Frecventa vizitelor zonei tratate trebuie sa fie la discretia operatorului, avand in vedere inspectia efectuata la inceputul tratamentului. Acea frecventa trebuie sa fie conforma cu recomandarile prevazute de codul de bune practici relevant.
- Starea de rezistenta a populatiei tinta trebuie luata in considerare atunci cand se alege rodenticidul de utilizat. In acele zone in care sunt suspectate dovezi de rezistenta la anumite ingrediente active, evitati utilizarea acestora. Pentru a controla raspandirea rezistentei, se recomanda alternarea momelilor care contin diferite ingrediente active anticoagulante.
- Protejati momeala impotriva conditiilor atmosferice (ploaie, zapada, etc.). Amplasati capcanele in zone fara risc de inundare.

- Indepartati momeala ramasa sau statiile de momeala la sfarsitul perioadei de tratament.
- Inlocuiti momelile deteriorate de apa sau contaminate cu pamant, din interiorul capcanelor.
- Pentru aplicare directa in vizuini: Momelile trebuie sa fie amplasate astfel incat sa reduca la minimum expunerea speciilor nevizate si a copiilor. Acoperiti sau blocati intrarile in vizuini cu momeala, pentru a reduce riscul de respingere si imprastiere a acesteia.

- Pentru tratament permanent: In cazul in care este posibil, se recomanda ca zona tratata sa fie verificata la fiecare 4 saptamani, cel mult, pentru a evita selectia oricarei populatii rezistente. [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

Utilizatori profesioniști instruiti: - zone exterioare deschise si depozite de deseuri

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenușiu si *Rattus rattus* – sobolanul negru de acoperis): 90-100 g momeala/statie de intoxicare.

-infestare mare: statii de intoxicare la fiecare 5 m

-infestare mica: statii de intoxicare la fiecare 10 m.

In vizuini: 90-100 g momeala/vizuina.

Instructiuni de utilizare:

- Pentru sobolani, folositi 90-100 g momeala in statii de momeala sigure, rezistente la distrugere, amplasate la 10 m distanta (5 m distanta in zonele cu infestare mare). Repetati tratamentul in situatii in care exista dovezi ale unei noi infestari (de exemplu, urme proaspete sau excremente). Nu miscati si nu deranjati punctele de momeala timp de cateva zile dupa ce s-a pus momeala. Daca nu se observa semne de activitate aproape de momeala dupa 7-10 zile, mutati momeala intr-o zona cu activitate mai mare a sobolanilor. Daca toata momeala din anumite zone a fost consumata, cresteti cantitatea de momeala prin plasarea mai multor puncte de momeala. Nu mariti dimensiunea punctului momeala.

- Statiile de momeala trebuie amplasate in imediata apropiere a locurilor unde a fost observata anterior activitatea rozatoarelor (de exemplu, cai de acces, trasee, locuri de cuibarire, gauri, burlane etc.).

- Pentru utilizare în exterior, statiile de intoxicare trebuie acoperite si plasate in locuri strategice pentru a reduce expunerea la speciile care nu sunt vizate.

- Verificati regulat consumul de momeala si inlocuiti momeala consumata sau deteriorata pana la incetarea consumului. Repetati tratamentul in situatii in care exista dovezi ale unei noi infestari (de exemplu, urme proaspete sau excremente). Faceti inspectii frecvente ale punctelor de momeala in primele 10-14 zile.

- Statiile de momeala trebuie vizitate la 5 - 7 zile la inceputul tratamentului si cel putin saptamanal dupa aceea, pentru a verifica daca momeala este acceptata, statiile de momeala sunt intacte si pentru



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

a indeparta corpurile rozatoarelor. Reumpleti momeala atunci cand este necesar.

- Frecventa vizitelor zonei tratate trebuie sa fie la discretia operatorului, avand in vedere inspectia efectuata la inceputul tratamentului. Acea frecventa trebuie sa fie conforma cu recomandarile prevazute de codul de bune practici relevant.
- Starea de rezistenta a populatiei tinta trebuie luata in considerare atunci cand se alege rodenticidul de utilizat. In acele zone in care sunt suspectate dovezi de rezistenta la anumite ingrediente active, evitati utilizarea acestora. Pentru a controla raspandirea rezistentei, se recomanda alternarea momelilor care contin diferite ingrediente active anticoagulante.
- Protejati momeala impotriva conditiilor atmosferice (ploaie, zapada,etc.). Amplasati capcanele in zone fara risc de inundare.
- Indepartati momeala ramasa sau statiile de momeala la sfarsitul perioadei de tratament.
- Inlocuiti momelile deteriorate de apa sau contaminate cu pamant, din interiorul capcanelor.
- Pentru aplicare directa in vizuini: Momelile trebuie sa fie amplasate astfel incat sa reduca la minimum expunerea speciilor nevizate si a copiilor. Acoperiti sau blocati intrarile in vizuinile cu momeala, pentru a reduce riscul de respingere si imprastiere a acesteia.
- Pentru tratament permanent: In cazul in care este posibil, se recomanda ca zona tratata sa fie verificata la fiecare 4 saptamani, cel mult, pentru a evita selectia oricarei populatii rezistente. [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

XIII. CONDITIILE DE DEPOZITARE : Pastrati recipientul original inchis etans. Depozitati in spatiu rocoros, uscat, bine ventilat, departe de actiunea directa a razelor solare. Depozitati in afara zonei de acces a copiilor, pasarilor, animalelor de casa, a celor de ferma .

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCID ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE : 2 ani

ALTE INFORMATII: Restrictii pentru utilizarea produsului biocid: Se va impiedica patrunderea in sol, in apele de suprafata, in sistemele de canalizare sau in apele din panza freatica . Se va aplica numai in cadrul recipientelor (spatiilor) pentru momeala asigurate si marcate in mod corespunzator. Momeala trebuie fixata astfel incat sa nu poata fi scoasa de catre rozatoare in afara statiilor.

Din cauza modului lent de actiune, rodenticidele anticoagulante își produc efectul după 4-10 zile de la consumul momelii.

Rozătoarele pot fi purtătoare de boli.

Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile neprotejate, utilizați mănuși sau instrumente (de exemplu, clești) atunci când le îndepărtați.

- Acest produs conține un aditiv amar și un colorant.

Prezenta autorizatie este însoțită de următoarele documente :

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fisa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către detinătorul autorizatiei a fisei cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RSI si Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative
Acest certificat reprezinta reinnoirea certificatului pentru autorizarea produsului biocid Nr. RO/2013/0032/MRA/IE/BPA 70004 + IE/BPA 70033

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

